



## NAŠE ZKUŠENOSTI S DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVOU

Přednášející

**M. Galková, V. Bujnová, D. Vrzalová**

II. Interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická, FN Olomouc

**Úvod:** Domácí parenterální výživa umožňuje zajistit plnohodnotnou dlouhodobou výživu u pacientů v domácích podmínkách. Týká se zejména pacientů s diagnózou syndromu krátkého střeva, těžkých forem střevních zánětů, akutních pankreatitid a jiných diagnóz.

**Metodika:** Základní jednotkou naší péče je nutriční poradna, ve které zajišťujeme dispenzarizaci pacientů, edukaci, zásobování pacientů zdravotnickými pomůckami, léky, zdravotnickou technikou apod. Poskytujeme péči, která je potřebná ke zvládnutí chronického onemocnění a jejich komplikací. Pro aplikaci domácí parenterální výživy je nutné zajistit dlouhodobý nebo střednědobý žilní vstup. Typ katétru vybíráme a zavádíme po důkladné terapeutické rozvaze a podle platných indikačních kritérií. Od roku 2015 na II. interní klinice zavádíme centrální PICC katétry a periferní MIDLINE katétry nejen pro naše pacienty, ale i pro pacienty z jiných klinických pracovišť. Nejobávanejšími komplikacemi jsou kanylová sepse a jejich dislokace. Důslednou ošetrovatelskou péčí, edukací zdravotníků a pečujících osob se jim snažíme předcházet.

**Výsledky:** Efekt léčby se odvíjí podle základní příčiny, pro kterou je dlouhodobá parenterální výživa indikována, zda se jedná o součást paliativní léčby u nádorového onemocnění nebo zda je indikována k překlenutí doby do zhojení píštěle nebo rekonstrukční operace gastrointestinálního traktu.

**Závěr:** Rozvojem onkologické péče a vlivem narůstající četnosti pacientů s onemocněním gastrointestinálního traktu je domácí parenterální výživa mnohem častěji indikována a představuje zkvalitnění života a mnohem větší šanci na přežití.